

Influenza A H1N1 de origen Porcina en Humanos

Definición operacional

Caso probable de influenza:

Toda persona de cualquier edad, que presente de manera brusca

1. Temperatura igual o superior a 39.0°C.
2. Tos seca.
3. Rinorrea activa.
4. Cefalea Intensa
5. Ojos Rojos” con lagrimeo.

Acompañada de uno o más de los siguientes síntomas

1. Coriza
2. Artralgias
3. Mialgias
4. Postración Ataque al estado general.
5. Odinofagia
6. Dolor torácico
7. Dolor abdominal
8. Diarrea líquida
9. Congestión nasal
10. Signos y síntomas de dificultad respiratoria de leve a Moderada.

Acciones a realizar frente a un caso probable

Aislamiento

1. Proporcionar cubrebocas al paciente de inmediato
2. Habitación para aislamiento

Contacto con pacientes:

1. Lavado y desinfección de manos con jabón, alcohol gel
2. Utilizar Gorro, lentes o goggles
3. Utilizar cubre bocas doble o mascarilla N95, antes de entrar
4. Utilización de bata y guantes antes del contacto,
5. Desechar guantes antes de salir
6. Utilización de anteojos de seguridad
7. Evitar entrar en contacto con las secreciones del paciente.
8. Lavar las manos antes y después de usar guantes

1. Ropa de Cama en bolsa cerrada etiquetada
2. Alimentos en loza desechable
3. Pañuelos, papel sanitario en bolsa roja
4. Habitación con alertas visuales sobre tipo de aislamiento

Tratamiento Medico *

1. Hospitalización en sala de aislamiento
2. Solución Glucosada 5%
3. Bromuro de Ipatropio inhalación cada 12 hrs.
4. Oseltamivir caps. 75 mg VO cada 12 hrs. x 5 días
5. Zanamivir inhalable 1 inhalación cada 12 hrs.
6. Diclofenaco ½ amp IV cada 12
7. Acetaminofen 1 tab. 500 mg VO cada 6 hrs.

* **Nota importante: el ácido acetilsalicílico está contraindicado**

Intervenciones de Enfermería

1. Canalizar vena
2. Tomar muestra laboratoriales
3. Vigilar signos vitales
4. Control de temperatura por medios físicos
5. Vigilar Signos y síntomas de dificultad respiratoria
6. Vigilar estado de conciencia
7. Administración de medicamentos
8. Control RPBI
9. Técnica de aislamiento respiratorio
10. Aplicación de precauciones estándar, de contacto y gotas
11. Brindar Educación para la salud (control de enfermedades, cuidados en el hogar)
12. Documenta en hoja de registros clínicos de enfermería

Toma de muestra de Laboratorio:
Tubo seco (muestra para serología viral)
Tubo con anticoagulante: BH, DHL

Toma de muestra de Exudado faringeo nasofaríngeo

Envío a LARRE